Tome 47, nº 17. — Août 1940.

Résultats des deux Missions scientiques suisses en Angola
1928-29, 1932-33.

# Nouvelle série de Coléoptères d'Angola

par

**Maurice PIC**

Sauf *Scaphidium angolense*, les nouveautés décrites ici proviennent des récentes récoltes et communications du Dr Monard qui, comme précédemment, a eu l'amabilité de me céder les *unica*. J'ai le plaisir de dédier au récolteur un nouveau genre et trois espèces nouvelles. A l'exception d'un Scaphidiide et d'un Hétéromère, placés en tête de cet article, tous les autres Insectes sont des Phytophages du groupe des Eumolpides.

*Scaphidium angolense* n. sp. [Scaphidiide].

Oblongum, antice et postice attenuatum, nitidum, nigrum, elytris in singulo infra humeros externe et ante apicem transverse rufo maculatis, pectore lateraliter testaceo, antennis ad basin tarsisque rufis; elytris paulo diverse, pro parte reducte lineato punctatis. Longueur: 6 mm.

Angola (coll. Pic).

Voisin de *S. pulchellum* Reitt., en diffère par le thorax noir, les élytres à dessins roux isolés.

*Ectenostoma monardi* n. sp. [Hétéromère].

Elongata, subparallela, convexa, nitida, olivaceo-viridis, fere glabra. Antennis parum elongatis et gracilibus, pro parte nigris, articulis ultimis incrassatis; capite dense punctato, pro parte cupreo; thorace parum breve; antice paulo attenuato, elytris paulo angustiore, parum fortiter et sparse punctato, postice medio

impresso; elytris elongatis, apice breve attenuatis, sat dense et irregulariter punctatis, pro parte plicatis, fere instriatis; pedibus metallicis, gracilibus. Longueur: 7-8 mm.

Kuvangu; Lunda, en septembre (plusieurs exemplaires in coll. Monard et Pic).

Peut se placer près de *E. nigra* Borch., en diffère par la coloration et la sculpture élytrale.

*Monardiella* n. gen. (Eumolpides)

Capite robusto, ante oculos impresso, mandibulis validis, oculis prominulis, paulo emarginatis; thorace immarginato, lateraliter subarcuato; elytris brevibus, convexis, humeris non prominulis, epipleuris distinctis; corpus pubescens; femoribus crassis, anticis minute dentatis, unguibus paulo fissis.

Genre, établi pour l'espèce nouvelle suivante, me paraissant voisine de *Melindea* Lef. et en différant (ex description) par les antennes à derniers articles grêles, le thorax subarqué latéralement, immarginé, les fémurs antérieurs seuls dentés, les tibias non droits.

*Monardiella subacuminata* n. sp.

Oblongo-subovata, convexa, nigro-aenea aut paulo cuprea, diverse albo pubescens, antennis testaceis, articulis ultimis apice nigris. Capite dense punctato aut plicato; elytris thorace non latioribus, brevibus, postice valde attenuatis et subacuminatis, minute et sparse punctatis. Longueur: 4—4,5 mm.

Ebanga, en novembre et V. de Ponte, en décembre (plusieurs exemplaires in coll. Monard et Pic).

*Angoleumolpus subelongatus* n. sp.

Oblongo-elongatus, nitidus, rufo-testaceus, oculis nigris. Capite fortiter punctato, in vertice fere impunctato; thorace breve, antice attenuato, minute et sparse punctato; elytris non brevibus, postice attenuatis, minute striato-punctatis. Longueur: 4 mm.

S. Amaro, en septembre (un exemplaire).

Diffère de *A. pallidicolor* Pic par la forme non raccourcie, le thorax plus rétréci en avant, les élytres un peu striés.

*Siagrus signatus* n. sp.

Oblongus, nitidus, pro parte luteus, pro parte nigro-olivaceus. Capite olivaceo, ad oculos et antice luteo signato, fortiter et sparse punctato; antennis piceis, ad basin luteis; thorace olivaceo, circa luteo marginato, breve et lato, lateraliter arcuato, sat fortiter sat dense punctato; scutello olivaceo; elytris luteis, ad basin et ad medium transverse et diverse olivaceo signatis, his latis et brevibus, pro parte substriatis et lineato punctatis; infra corpore bicolorato; pedibus luteis, femoribus apice et tibiis ad basin olivaceis, femoribus parum crassis, dentatis. Longueur: 4 mm.

S. Amaro, en septembre (un exemplaire).

Espèce caractérisée par son thorax arqué conjointement à sa particulière coloration.

*Siagrus discoidalis* n. sp.

Oblongus, nitidus, niger, capite thoraceque rufis et minute punctatis, antennis nigris, ad basin testaceis, scutello elytrisque testaceis, his in disco et in singulo antice longe nigro signatis. Thorace parum transverso, antice attenuato; elytris latis et brevibus; minute lineato punctatis; pedibus parum elongatis, femoribus dentatis. Longueur: 5 mm.

V. de Ponte, en décembre (un exemplaire).

Peut se placer près de *S. bimaculatus* Lef., en diffère par les élytres non striés, les pattes plus foncées, etc.

*Siagrus bicoloripes* v. nov. *semirufus.*

Oblongus, capite thorace scutelloque rufis, elytris cyaneo-violaceis, striato-punctatis; pedibus pro majore parte metallicis, femoribus dentatis.

V. de Ponte (coll. Monard et Pic).

La forme typique a l'avant-corps foncé.

*Siagrus viridicollis* n. sp.

Oblongus, nitidus, viride metallicus, elytris diverse rufis, membris pro parte rufis. Capite thoraceque sat minute et sparse punctatis, illo parum breve, antice attenuato; antennis rufis, apice nigris; elytris latis et brevibus, striatis aut fortiter lineato-punc-

tatis, rufis, ad medium et commune late viride notatis (forma typica), aut in disco reducte viride notatis, sutura viridis (var. *disjunctus)*, aliquot elytris rufis *(v. obliteratus)*; infra corpore viridescente; pedibus rufo-testaceis, femoribus apice diverse nigris aut piceis, aliquot late viridibus. Longueur: 4,5-5 mm.

V. de Ponte, en décembre (coll. Monard et Pic).

Voisin du précédent. Caractérisé par la coloration de l'avant-corps qui est d'un vert métallique, tandis que les élytres sont diversement roux.

*Menius rufus* n. sp.

Oblongus, nitidus, concolor, rufus, antennis nigris, ad basin rufis. Capite rugoso-punctato, ad oculos profunde et triangulariter sulcato, oculis griseis; thorace breve et lato, lateraliter subarcuato, parum fortiter et sparse punctato; elytris thorace paulo latioribus, sat brevibus, diverse fortiter punctatis; femoribus dentatis. Longueur: 4,5 mm.

Chimporo, en novembre (un exemplaire).

Espèce très caractérisée par sa coloration générale rousse.

*Pagria rufoscutellaris* n. sp.

Oblongo-subovata, nitida, rufo-testacea, sutura aliquot brunnescens. Capite fortiter punctato; thorace breve, lateraliter subarcuato, sat fortiter et sparse punctato; elytris latis et brevibus, antice paulo impressis, diverse, pro parte fortiter lineato punctatis, lateraliter costulatis; femoribus minute dentatis. Longueur: 3 mm.

Katumbela, juin et août (coll. Monard et Pic).

Voisin de *P. suturalis* Lef., avec une coloration générale claire.

*Pagria apicalis* n. sp.

Oblongo-subovata, nitida, nigra, elytris ad apicem luteo maculatis, membris luteis. Capite fortiter sat dense punctato; thorace sat breve, lateraliter subarcuato, fortiter et dense punctato; elytris latis, sat brevibus, postice valde attenuatis, antice paulo impressis, in disco diverse lineato punctatis, lateraliter irregulariter punctatis et sinuate unicostatis. Longueur: 2 mm. environ.

A placer près de *P. varidus* Lef., s'en distingue à première vue par chaque élytre orné d'une macule préapicale jaune.

Kuvangu, en décembre (un exemplaire).

*Pagria monardi* n. sp.

Oblongo-subovata, nitida, aenea, antennis, tibiis tarsisque rufis. Capite sat minute et sparse punctato; thorace parum breve, antice attenuato, sat minute et sparse punctato; elytris latis et brevibus, apice breve attenuatis, parum fortiter lineato-punctatis, lateraliter impresso punctatis. Longueur: 2-3 mm.

Lunda, en septembre (coll. Monard et Pic).

Espèce très caractérisée ayant un facies de *Pachnephorus* Redt. mais avec le dessus non squamuleux et la tête munie de chaque côté d'un petit sillon très net, écarté de l'œil.

*Eryxia dentipes* n. sp.

Oblonga, sat robusta, subopaca, rufa, squamulis elongatis albis vestita, his pro majore parte sparsis, scutello et pectore dense squamulatis, antennis piceis, ad basin testaceis. Thorace sat breve et parum lato, postice paulo angustiore, dense punctato; elytris thorace valde latioribus, parum elongatis, apice attenuatis, infra humeros impressis, dense ruguloso-puncatis; pedibus parum elongatis, femoribus subclavatis, tibiis posticis extus apice longe dentatis. Longueur: 7 mm.

Lunda, en septembre (un exemplaire).

Espèce caractérisée par sa taille avantageuse pour le genre et robuste, les tibias munis d'une longue dent.

*Dermoxanthus monardi* n. sp.

Oblongus, nitidus, metallicus, viridescens, elytris aliquot pro parte rufo tinctis, epipleuris et membris testaceis, infra corpore aliquot diverse rufescente. Capite subalutaceo, medio sulcato, sparse punctato; thorace breve et lato, antice angustiore, lateraliter fere recto et marginato, minute et sparse punctato; elytris thorace paulo latioribus, parum elongatis, postice attenuatis, sat minute et irregulariter punctatis, pro parte transverse plicatis; femoribus diverse crassis, anticis fortiter dentatis. Longueur: 5-5,5 mm.

S. Amaro, en septembre (coll. Monard et Pic).

Je place dubitativement dans le genre *Dermoxanthus* Baly cette espèce surtout caractérisée par la sculpture élytrale et les cuisses antérieures munies d'une forte dent.

*Dermoxanthus monardi* v. n. *rufescens.*

Oblongo-elongatus, rufescens, paulo iridescens; thorace transverso, minutissime et sparse punctato; elytris diverse lineato-punctatis, implicatis. Longueur: 5 mm.

S. Amaro (un exemplaire).

Se distingue de *monardi mihi* par la forme plus allongée, la ponctuation différente et la coloration générale roussâtre.

## INDEX ALPHABÉTIQUE DES GENRES

Cet index comprend les genres traités dans les articles suivants de la Revue suisse de zoologie:

I. Coléoptères (Clavicornes, Clérides, Malacodermes, Hétéromères, Bruchides, Phytophages) d'Angola. 1931, t. 38, nº 24, pp. 419-427.

II. Coléoptères Phytophages d'Angola (Cryptocéphalides et divers). 1936, t. 43, nº 28, pp. 623-629.

III. Coléoptères d'Angola. 1937, t. 44, nº 6, pp. 105-109.

IV. Coléoptères (Clavicornes, Malacodermes, Hétéromères e. p. et Endomychides) d'Angola. 1937, t. 44, nº 33, pp. 483-489.

V. Coléoptères Phytophages d'Angola. 1939, t. 46, nº 4, pp. 115-142.

VI. Nouvelle série de Coléoptères d'Angola (présent article).

*Acanthocnemus*, Malac. IV 484
*Allecula*, Allecul. . . . I 422
*Ancylopus*, Endomych. IV 489
*Angoleumolpus*, Eumolp. V 133
VI 360
*Anteriscus*, Cryptoceph. II 628
*Antipa*, Clytr. . . . . V 135
*Antongilium*, Scaphi. . I 420
*Apalochrus*, Malacod. . I 421
IV 484
*Apophylia*, Galéruc. . . II 628
*Attagenus*, Dermest.. . IV 483
*Cephaloclerus*, Clér. . . I 420
*Ceroctis*, Melo. . . . . I 423
*Chlamys*, Chlamy. . . I 426
*Clytra*, Clytr. . . . . I 425
V 139
*Colasposoma*, Eumolp. . I 426
II 628
V 117
*Colobapsis*, Megalop. . III 108

*Coptocephala*, Clytr. . I 425
V 141
*Crioceris*, Criocer. . . . III 107
*Cryptocephalus*, Crypto-cephal. I 426
II 624
*Cyaniris*, Clytr.. . . . V 140
*Cyaneolytta*, Melo.. . . I 423
*Cylidrus*, Clér. . . . . III 105

*Danae*, Endomych. . . IV 489
*Dermestes*, Dermest. . . I 420
*Dermoxanthus*, Eumolp. VI 363
*Diaphanes*, Malacod. . IV 483
*Diapromorpha*, Clytr. . I 424
*Dorcathispa*, Hisp. . . I 426

*Ectenostoma*, Hétérom.. VI 359
*Eletica*, Melo.. . . . . IV 487
*Epicauta*, Melo.. . . . I 423
*Erymanthus*, Clér.. . . III 106
*Eryxia*, Eumolp. . . . VI 363

*Formicocomus*, Anthic.. I 422
IV 485

*Gargilius*, Ténébrion. . I 422
*Gyponyx*, Clér. . . . . III 105

*Ichthyurus*, Malthi. . . IV 484

*Lagria*, Lagri. . . . . I 422
*Lefevrea*, Eumolp. . . V 125
*Lema*, Criocer. . . . . I 423
III 107
V 116
*Lepthispa*, Hisp. . . . II 623
*Leucostea*, Mégalop. . . II 628
III 108
*Liliocoris*, Criocer. . . V 116
*Liniscus*, Eumolp. . . V 127
*Lycus*, Lyc. . . . . I 421
*Lyprops*, Ténébrion.. . I 422

*Macrocoma*, Eumolp. . V 121
*Malegia*, Eumolp. . . I 426
*Melitonoma*, Clytr. . . I 425

*Melixanthus*, Cryptoc. I 426
II 628
*Menius*, Eumolp. . . . VI 362
*Metallonotus*, Tenebrion. IV 487
*Microtrycherus*, Endom. IV 488
*Monardiella*, Eumolp. . VI 360
*Mordellistena*, Mordell.. IV 485

*Necrobia*, Clér. . . . . III 106
*Nerissus*, Eumolp. . . V 120
*Notoxus*, Anthic. . . . I 422
IV 485

*Pagria*, Eumolp. . . . VI 362
*Peploptera*, Clytr. . . I 424
V 137
*Phloeocopus*, Clér. . . . III 105
*Platydema*, Tenebrion. . I 422
IV 486
*Protoclytra*, Clytr. . . . V 136
*Pseudhispella*, Hisp. . . I 426
*Pseudocolapsis*, Eumolp. V 122

*Rhambastus*, Eumolp. . V 130

*Sagra*, Sagr. . . . . I 423
V 134
*Scaphidium*, Scaphi. . VI 359
*Scelodonta*, Eumolp. . . V 120
*Syagrus*, Eumolp.. . . II 628
V 128
VI 361
*Sigrisma*, Criocér.. . . III 108
*Spermophagus*, Bruch. . I 423
*Sphondilia*, Megalop. . III 109
V 115
*Stenalia*, Mordell. . . IV 485
*Synallecula*, Allecul. . . I 422

*Tarsostenus*, Clér. . . III 106
*Thanasimus*, Clér. . . III 106
*Trycherus*, Endomych.. IV 487

*Zonabris*, Mélo. . . . . I 423
*Zonitomorpha*, Canthar. I 423
*Zophosis*, Ténébrion. . I 422
*Zygia*, Malacod. . . . I 421